

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Kriteria ibu hamil dan menyusui yang dapat menerima vaksin COVID-19 antara lain; suhu tubuh normal 37,5 °C, usia kehamilan > 3 minggu, tidak mengalami preeklampsia, tidak memiliki alergi berat, jika memiliki penyakit komorbid harus terkontrol, tidak sedang menjalani pengobatan *immunosupressant*, kelainan darah, pembekuan darah, defisiensi imun dan menerima transfusi darah.
2. KIPPI selain gejala umum dari vaksinasi COVID-19 yang dialami ibu hamil dan menyusui antara lain; Kontraksi rahim, perubahan suplai susu, perdarahan vagina, perubahan warna susu, ketuban pecah sebelum persalinan, kelahiran prematur, keguguran, kematian neonatus, saluran susu tersumbat, perdarahan postpartum, pembengkakan payudara, kelainan janin, mastitis (radang kelenjar susu), dan ukuran kecil untuk usia kehamilan. Vaksin COVID-19 aman digunakan ibu hamil dan menyusui.
3. Vaksin COVID-19 efektif untuk digunakan pada ibu hamil dan menyusui. Selain memberikan perlindungan pada ibu hamil dan menyusui, vaksin COVID-19 juga memberikan antibodi terhadap SARS-CoV-2 ke janin atau bayi yang disusui.

#### **B. Saran**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian, serta menambah informasi mengenai persepsi masyarakat yang berhubungan dengan penggunaan Vaksin sebagai upaya pencegahan COVID-19.