

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Profil pengobatan regimen kemoterapi kanker payudara di rawat inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda yang banyak diresepkan ialah kombinasi docetaxel-doxorubicin yaitu dengan jumlah 125 pasien (13.1%). Selain itu, obat dexametason paling banyak diresepkan sebagai obat penyerta dalam pengobatan kemoterapi kanker payudara dengan jumlah 198 obat (32.9%).
2. Dari jumlah pasien sebanyak 198 pasien berhasil diidentifikasi sebanyak 899 kasus interaksi yang terjadi yakni interaksi antar obat kemoterapi dengan obat kemoterapi seperti doxorubicin-docetaxel dengan jumlah 128 (14.2%) kasus dengan tingkat keparahannya ialah *moderate*. Kemudian interaksi obat kemoterapi dengan obat penyerta yaitu dexametason-docetaxel sebanyak 172 (19.1%) dengan tingkat keparahan *minor*. Sedangkan interaksi obat penyerta dengan obat penyerta yakni dexamethasone-ondansetron sebanyak 182 (20.2%) dengan tingkat keparahan *moderate*.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya terkait pengobatan kemoterapi pada pasien kanker payudara dan interaksi antar obat yang diberikan dapat memperbanyak jumlah sampel agar mendapatkan hasil yang optimal dan juga dapat memperbanyak referensi dalam instrumen yang digunakan selain Medscape dan drugs.com agar dapat menjadi acuan bagi masyarakat maupun mahasiswa.