

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dari dapat disimpulkan bahwa :

1. Efek samping setelah mendapatkan kemoterapi pada pasien kanker payudara yaitu mual muntah sebanyak 130 pasien yang mengalami mual muntah, kemudian pada pasien yang mengalami mual sekitar ada 68 pasien.
2. Dari jumlah pasien sebanyak 198 mendapatkan hasil dari obat antiemetik yang paling banyak digunakan ialah obat ondansetron sebanyak 197 pasien maupun yang diberikan secara intravena dan oral. Kombinasi antiemetik yang sering diberikan ialah obat Dexamethason injeksi dan obat Ondansetron. Dan obat regimen kemoterapi yang paling banyak digunakan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda ialah obat Docetaxel-Doxorubicin sebanyak 139 pasien (70%).

B. Saran

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan studi pendahuluan, apabila penelitian tertarik dengan penelitian serupa. Agar mendapatkan hasil yang optimal dan juga dapat memperbanyak referensi agar dapat menjadi acuan masyarakat dan mahasiswa.