

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. cold pack dapat digunakan sebagai alternatif pengurangan nyeri nonfarmakologis pada pasien fraktur tertutup.

#### **B. Saran**

1. Institusi akademik.

Diharapkan pihak Lembaga ini memberikan panduan tambahan tentang penggunaan kegiatan seperti kompres dingin untuk mengurangi tingkat nyeri pada orang dengan patah tulang untuk membantu siswa meningkatkan pemikiran kritis dalam praktik intervensi yang dilakukan di mana pun lokasinya. Jurnal Keperawatan dan Berita Terbaru.

2. Perawat

Kami berharap perawat dapat menawarkan intervensi non-obat kepada pasien dengan nyeri akut, terutama pada fraktur ekstremitas tertutup..

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang dimodifikasi hegemoni yg telah terdapat menggunakan yg baru, sebagai akibatnya bisa diberikan dalam pasien Fraktur ekstremitas tertutup yg memiliki keluhan nyeri akut.