

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Profil pengobatan pada pasien tukak peptik jenis terapi yang paling banyak digunakan adalah kombinasi PPI (*proton pump inhibitor*) + sitoprotektif (pelindung mukosa) sebesar 54,1% dan kombinasi PPI (*proton pump inhibitor*) + antibiotik + sitoprotektif sebesar 10,8%. Obat yang paling banyak digunakan adalah omeprazole (37,9%), sukralfat (27,5%), lansoprazole (6,9%), amoxicillin (6,9%), clarithromycin (6,7%), pantoprazole (5,7%), ranitidine (5,6%), rebamipide (2,2%), dan metronidazole (1,1%).
2. Rasionalitas pada pasien tukak peptik pada penggunaan antibiotik dengan metode *gyssens* didapatkan kategori 0 sebanyak 5 pasien (83,3%) dan kategori IVA sebanyak 1 pasien (16,7%). Rasionalitas pada pasien tukak peptik pada penggunaan obat pengontrol asam lambung didapatkan tepat indikasi 97,3%, tepat dosis 62,2%, tepat durasi 100%.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adapun saran pada penelitian ini :

1. Bagi instansi, ditingkatkan dan dilakukan evaluasi mengenai penyimpanan data rekam medik.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian mengenai analisis rasionalitas tukak peptik dengan metode prospektif agar dapat mengetahui kondisi klinis pasien secara langsung dan mendapatkan hasil penelitian dapat lebih maksimal.