

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa:

- 1) Pola penggunaan antihiperlipidemia adalah golongan statin yang terdiri dari atorvastatin 20 mg (62,67%), simvastatin 10 mg (2,67%) dan simvastatin 20 mg (33,33%) serta golongan fibrat yaitu fenofibrate 150 mg (1,33%).
- 2) Karakteristik pasien berdasarkan demografi sosial meliputi jenis kelamin terbanyak yaitu perempuan (64%), rentang usia terbanyak yaitu usia 55-65 tahun (48%), latar belakang pendidikan terbanyak yaitu SMA (46,67%), latar belakang pekerjaan terbesar yaitu ibu rumah tangga (45,33%), mayoritas pasien memiliki berat badan berlebih (42,67%), serta lebih dominan memiliki penyakit penyerta (76%), profil lipid dominan tidak normal yaitu kolesterol total (70,67%), Trigliserida (54,67%), LDL (64%) dan HDL (62,67%).

4.2. Implikasi

Setelah melakukan penelitian maka peneliti memberikan saran bahwa:

- 1) Bagi instansi, dapat mempertahankan cara pengolahan berkas rekam medik pasien mulai dari kelengkapan penataan berkas, pemberian kode serta penyimpanan yang tersusun dengan rapi.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya jika ingin mengangkat tentang hiperlipidemia di RS SMC disarankan untuk meneliti tentang evaluasi rasionalitas penggunaan antihiperlipidemia.