

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan profil pengobatan gastritis obat yang paling sering digunakan yaitu pantoprazole sebanyak 58 pasien (40%) dengan dosis dan aturan pakai 2 x 40 mg.
2. Berdasarkan analisis interaksi obat yang dilakukan didapatkan 17 kejadian interaksi obat. Pada mekanisme, interaksi farmakokinetik sebanyak 17 kejadian (100%), dengan tingkat keparahan *minor* sebanyak 10 kejadian (58,82%), *moderate* sebanyak 6 kejadian (35,29%) dan *major* sebanyak 1 kejadian (5,88%).

#### B. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disarankan apoteker dan dokter dapat bekerja sama lebih efektif untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya interaksi obat yang merugikan pada pasien gastritis.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk penelitian serupa, disarankan untuk terlebih dahulu melakukan studi pendahuluan dengan menggunakan beberapa referensi untuk melihat jumlah kasus di lokasi tersebut.