

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Sidomulyo terhadap 23 partisipan, dapat diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Setelah menerima kotak obat, pasien diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Sidomulyo menunjukkan tingkat kepatuhan yang bervariasi. Ini terlihat dari nilai signifikansi yang lebih rendah daripada nilai alpha ($p=0,014 < \alpha = 0,05$).
2. Terbukti bahwa kadar gula darah pasien diabetes melitus tipe 2 berbeda secara signifikan ($p=0,002 < \alpha = 0,05$) sebelum dan setelah menggunakan kotak obat.
3. Penelitian di Puskesmas Sidomulyo menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara kadar gula darah dan tingkat kepatuhan pasien diabetes melitus tipe 2 ($p=0,657 < \alpha = 0,05$).

B. Saran

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif sebagai informasi pada pendidikan dalam menciptakan dan meningkatkan standar pengajaran di masa depan, serta membantu dalam meningkatkan pengetahuan baru mengenai peningkatan kepatuhan dalam minum obat khususnya obat antidiabetik oral.