

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Sebelum diberikan intervensi *Pill box* diperoleh hasil kepatuhan rendah sebanyak 17 orang (73,9%)
2. Setelah pemberian *Pill box* kepatuhan rendah berkurang menjadi 7 orang (30,4%).
3. Terdapat pengaruh dari penggunaan *Pill box* sebelum dan sesudah dalam rentang waktu satu bulan. Terbukti dari data nilai didapatkan hasil Negative sebanyak 16 responden, hasil Ties 7 responden dan tidak didapat penurunan atau Positive 0 responden. Terdapat signifikansi dalam uji wilcoxon dapat dilihat dari p atau nilai signifikansi yaitu 0,00 ($p = 0,00 < \alpha 0,05$) yang bermakna ada perbedaan tingkat kepatuhan pada pasien sebelum mempergunakan *Pill box* dan sesudah mempergunakan *Pill box*.

Dari jawaban di atas dapat disimpulkan penggunaan *Pill box* pada responden Puskesmas Sidomulyo berpengaruh meningkatkan kepatuhan dapat terlihat dari data sebelum dan sesudah penggunaan *Pill box*.

B. Saran

Peneliti berikutnya diharapkan bisa melanjutkan penelitian ini melalui penggunaan teknik lain dan dapat meningkatkan lagi penelitian tentang tingkat kepatuhan konsumsi obat.