

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di simpulkan bahwa dari 5 jurnal Nasional dan 3 jurnal Internasional yang di analisis pada bab IV bahwa gambaran faktor umur, paritas, bblr, prematuritas, ketuban pecah dini bercampur mekonium, paritas terjadinya asfiksia ada hubungannya dengan kejadian asfiksia dan 2 jurnal nasional menjelaskan bahwa tali pusat ada hubungannya dengan faktor terjadinya asfiksia neonatorum.

B. Saran

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan bisa menjadi bahan acuan dan bahan pada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian gambaran faktor terjadinya asfiksia.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil artikel yang telah di teliti peneliti memberikan saran untuk lebih memperhatikan kesehatan kehamilan atau lebih sering dalam mengontrol kehamilan ke tenaga kesehatan agar tidak dapat terjadinya adanya gangguan kesehatan atau sampai terjadinya kematian pada bayi.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Kesehatan

Menambah keluasan ilmu dalam keperawatan untuk lebih mengetahui faktor dari kejadian asfiksia pada bayi dan lebih

mengetahui perkembangan pada setiap tahunnya pada kejadian asfiksia serta perbandingan dalam melakukan penelitian pada kejadian asfiksia.