

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dirasakan dari reaksi suntikan banyak mengalami bengkak pada lokasi penyuntikan dan nyeri pada lokasi penyuntikan pada dosis ke-1 jenis vaksin Astrazeneca paling banyak mengalami nyeri pada lokasi penyuntikan, begitu juga pada vaksin Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Reaksi suntikan pada dosis ke-2 jenis vaksin Astrazeneca paling banyak mengalami nyeri pada lokasi penyuntikan juga pada vaksin Moderna, Pfizer, dan Sinovac. dosis ke-3 jenis vaksin Astrazeneca paling banyak mengalami nyeri pada lokasi penyuntikan, begitu juga pada vaksin Moderna, Pfizer, dan Sinovac.

Reaksi vaksin Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dirasakan ialah demam tinggi/ menggigil, lemas, pusing, mengantuk, kebas pada tubuh tertentu. Pada dosis ke-1 reaksi suntikan Astrazeneca paling banyak mengalami pusing, pada vaksin Moderna lebih banyak mengalami demam tinggi / menggigil dan mengantuk, vaksin Pfizer dan vaksin Sinovac lebih banyak mengalami mengantuk. Reaksi vaksin pada dosis ke-2 jenis vaksin Astrazeneca paling banyak mengalami mengantuk pada vaksin Moderna dan vaksin Pfizer lebih banyak merasakan lemas dan vaksin Sinovac lebih banyak mengalami mengantuk. dosis ke-3 jenis vaksin Astrazeneca paling banyak mengalami mengantuk, pada vaksin Moderna lebih banyak mengalami demam/menggigil, Pfizer dan Sinovac lebih banyak mengalami lemas yang dirasakan.

B. Saran

Pada saat setelah melakukan vaksin sebaiknya diberikan obat untuk meringankan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dirasakan oleh peserta vaksin hingga apa yang dirasakan akan hilang

dengan sendirinya, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemasan yang berlebihan.